



Catálogo 2025

Tomate para processamento industrial





CVR 8161



Híbrido com alto potencial produtivo e excelentes sanidade e capacidade de espera. Muito estável em Goiás (alta e baixa altitudes).



Ensaio 2024*

Resistências genéticas	V F F N P	
Ciclo	120 a 130 dias	
Tamanho da planta	Grande	
Sanidade foliar	Boa	66,3 % de cobertura foliar na colheita
Potencial produtivo	Alto	175,9 t/ha
Capacidade de espera	Boa	3,6 % de podres
Forma dos frutos	Oblongo	comp./diâm. = 1,7
Tamanho dos frutos	Médio	56,9 g
Cor	Média	nota = 2,7
Firmeza	Alta	10,3 kgf/cm ²
Espessura da parede	Média	6,1 mm
°Brix do suco	Médio	4,7 ° Brix
pH do suco	Médio	4,67
Consistência do suco (Bostwick)	Média	14,7 cm

* Médias provenientes de 6 parcelas experimentais conduzidas em áreas comerciais no Estado de Goiás durante a safra 2024.

Posicionamento

Região	Goiás e SP
População de plantas	25 a 30 mil plantas/ha
Espaçamento	1,20 a 1,30 m

Janela de plantio

Fev				Mar				Abr				Mai				Jun			
1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
							X	X	X	X	X	X	X	X					

Fev				Mar				Abr				Mai				Jun			
1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
											X	X	X	X	X	X	X		



CVR 2113



Qualidade de frutos: alto brix e excelente cor. Boa sanidade foliar e resistência ao vira-cabeça.



Ensaaios 2024*		
Resistências genéticas	V FF N P Sw	
Ciclo	120 dias	
Tamanho da planta	Grande	
Sanidade foliar	Boa	65,4 % de cobertura foliar na colheita
Potencial produtivo	Médio	137,2 t/ha
Capacidade de espera	Média	4,6 % de podres
Forma dos frutos	Bloco	comp./diâm. = 1,4
Tamanho dos frutos	Médio	53 g
Cor	Boa	nota = 3,5
Firmeza	Média	9,1 kgf/cm ²
Espessura da parede	Média	5,59 mm
°Brix do suco	Médio	4,9 ° Brix
pH do suco	Médio	4,64
Consistência do suco (Bostwick)	Grossa	11,9 cm

* Médias provenientes de 6 parcelas experimentais conduzidas em áreas comerciais no Estado de Goiás durante a safra 2024.

Posicionamento

Região	Goiás
População de plantas	24 a 30 mil plantas/ha
Espaçamento	1,20 a 1,30 m

Janela de plantio

Fev				Mar				Abr				Mai				Jun			
1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
						X	X	X	X	X	X								



CVR 2118



**Plantas com boa sanidade foliar e estabilidade.
Frutos com alta consistência e boa cor. Possui
resistência ao vira-cabeça.**



Ensaaios 2024*		
Resistências genéticas	V FF N P Sw	
Ciclo	120 a 130 dias	
Tamanho da planta	Média	
Sanidade foliar	Boa	63,3 % de cobertura foliar na colheita
Potencial produtivo	Médio	145,1 t/ha
Capacidade de espera	Boa	2,1 % de podres
Forma dos frutos	Bloco	comp./diâm. = 1,4
Tamanho dos frutos	Médio	54 g
Cor	Média	nota = 3,1
Firmeza	Média	8,8 kgf/cm ²
Espessura da parede	Média	5,82 mm
°Brix do suco	Médio	4,5 ° Brix
pH do suco	Médio	4,69
Consistência do suco (Bostwick)	Grossa	10 cm

* Médias provenientes de 6 parcelas experimentais conduzidas em áreas comerciais no Estado de Goiás durante a safra 2024.


Posicionamento

Região	Goiás e norte de Minas
População de plantas	25 a 30 mil plantas/ha
Espaçamento	Máx. 1,20 m

Janela de plantio

Fev				Mar				Abr				Mai				Jun			
1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
					X	X	X	X	X	X	X	X	X						

Híbrido produtivo e com alto brix, ideal para se obter bons rendimentos de polpa na época nobre. Possui resistência ao vira-cabeça.



Ensaio 2024*		
Resistências genéticas	V F F N P Sw	
Ciclo	120 dias	
Tamanho da planta	Média	
Sanidade foliar	Média	57,5 % de cobertura foliar na colheita
Potencial produtivo	Médio	140 t/ha
Capacidade de espera	Média	4,7 % de podres
Forma dos frutos	Bloco	comp./diâm. = 1,3
Tamanho dos frutos	Médio	53,2 g
Cor	Média	nota = 2,9
Firmeza	Média	9,2 kgf/cm ²
Espessura da parede	Média	5,65 mm
°Brix do suco	Médio	4,7 ° Brix
pH do suco	Médio	4,61
Consistência do suco (Bostwick)	Grossa	11,8 cm

* Médias provenientes de 6 parcelas experimentais conduzidas em áreas comerciais no Estado de Goiás durante a safra 2024.

Posicionamento

Região	Goiás
População de plantas	25 a 30 mil plantas/ha
Espaçamento	1,20 m

Janela de plantio

Fev				Mar				Abr				Mai				Jun			
1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
								X	X	X	X								



CVR 1478



Híbrido com alto potencial produtivo e boa estabilidade. Possui resistência ao vira-cabeça.



Ensaios 2024*		
Resistências genéticas	V F F N P Sw	
Ciclo	120 dias	
Tamanho da planta	Média	
Sanidade foliar	Média	57,5 % de cobertura foliar na colheita
Potencial produtivo	Alto	152,9 t/ha
Capacidade de espera	Boa	2,9 % de podres
Forma dos frutos	Bloco	comp./diâm. = 1,4
Tamanho dos frutos	Médio	50,1 g
Cor	Média	nota = 3,0
Firmeza	Média	9,4 kgf/cm ²
Espessura da parede	Média	5,69 mm
°Brix do suco	Médio	4,7 ° Brix
pH do suco	Médio	4,65
Consistência do suco (Bostwick)	Grossa	12,1 cm

* Médias provenientes de 6 parcelas experimentais conduzidas em áreas comerciais no Estado de Goiás durante a safra 2024.

Posicionamento	Região	Goiás
	População de plantas	25 a 30 mil plantas/ha
	Espaçamento	1,20 a 1,30 m

Janela de plantio

Fev				Mar				Abr				Mai				Jun			
1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
									X	X	X	X	X	X					



CVR 1479



Híbrido com alto potencial produtivo e com boa sanidade. Possui resistência ao vira-cabeça.



Ensaaios 2024*		
Resistências genéticas	V FF N P Sw	
Ciclo	120 a 130 dias	
Tamanho da planta	Média	
Sanidade foliar	Boa	65,8 % de cobertura foliar na colheita
Potencial produtivo	Médio/Alto	148,4 t/ha
Capacidade de espera	Boa	3,3 % de podres
Forma dos frutos	Bloco	comp./diâm. = 1,3
Tamanho dos frutos	Pequeno	49,2 g
Cor	Média	nota = 3,0
Firmeza	Média	9,5 kgf/cm ²
Espessura da parede	Média	5,91 mm
°Brix do suco	Médio/Alto	5,0 ° Brix
pH do suco	Médio	4,64
Consistência do suco (Bostwick)	Grossa	11,9 cm

* Médias provenientes de 6 parcelas experimentais conduzidas em áreas comerciais no Estado de Goiás durante a safra 2024.

Posicionamento	Região		Goiás	
	População de plantas		25 a 30 mil plantas/ha	
Espaçamento		1,20 a 1,30 m		

Janela de plantio

Fev				Mar				Abr				Mai				Jun			
1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª	1ª	2ª	3ª	4ª
							X	X	X	X	X	X	X						

Resistências genéticas

V: possui o gene Ve que confere resistência à murcha-de-verticílio causada pelo fungo *Verticillium dahliae* raça 1.

FF: possui o gene I3 que confere resistência à murcha-de-fusário causada pelo fungo *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* raça 2.

N: possui o gene Mi que confere resistência aos nematóides-das-galhas.

P: possui o gene Pto que confere resistência à pinta-bacteriana causada por *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* raça 0.

Sw: possui o gene Sw5 que confere resistência ao vira-cabeça do tomateiro.

Sanidade foliar (cobertura foliar)

Ruim < 40%
Média 40-60%
Boa > 60%

Potencial produtivo

Baixo < 130 t/ha
Médio 130 -150 t/ha
Alto > 150 t/ha

Capacidade de espera (taxa de frutos podres)

Baixa > 6% de podres
Média 4-6% de podres
Boa 2-4% de podres
Excelente < 2%

Tamanho dos frutos (massa fresca dos frutos)

Pequeno < 50 g
Médio 50 -60 g
Grande > 60 g

Cor (nota)

Muito ruim: 1
Ruim: 2
Média: 3
Boa: 4
Excelente: 5

Firmeza

Ruim < 7 kgf/cm²
Médio 7-10 kgf/cm²
Alto > 10 kgf/cm²

Espessura da parede

Fina < 5,5 mm
Média 5,5-6,5 mm
Grossa > 6,5 mm

Brix do suco

Baixo < 4,4 °Brix
Média 4,4 - 5,0 °Brix
Alto > 5,0 °Brix

pH do suco

Baixo < 4,4
Média 4,4 – 4,7
Alto > 4,7

Bostwick (suco)

Fino > 15 cm
Média 13-15 cm
Grosso < 13